Mécanique et Applications à l'Astrophysique

Durée 1h00

Aucun document n'est autorisé
Seules les calculatrices UPS sont autorisées

A. Questions de cours (5 points)

- 1) Énoncer les trois lois de Kepler.
- 2) Énoncer le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel. Appliquer ce théorème pour exprimer le champ de gravitation à la surface de la Terre en fonction de sa masse M_T et de son rayon R_T .

B. Problème (15 points)

Chute d'une bille dans le référentiel terrestre

On se propose d'étudier la chute d'une bille, assimilée à un point matériel B , dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$. La bille, de masse m est abandonnée, dans ce référentiel, sans vitesse initiale d'une hauteur h à un instant $t = 0$. Le référentiel $\mathcal{R}$ est situé à la latitude λ et les axes du repère associé sont choisis de façon à ce que l'axe (Ax) pointe vers l'Est, l'axe (Ay) vers le Nord et l'axe (Az) est vertical ascendant (voir figure). On notera Ω la vitesse angulaire de rotation de la Terre. Enfin, on ne tiendra pas compte de la résistance de l'air.

- 1) Montrer que la loi fondamentale de la dynamique pour le mouvement de B par rapport à $\mathcal{R}$ prend la forme suivante :

$$m\mathbf{a}_{B/\mathcal{R}} = m\mathbf{g} - 2m\boldsymbol{\Omega} \wedge \mathbf{v}_{B/\mathcal{R}}. \quad (1)$$

Donner la signification physique de chaque terme et expliciter notamment les termes vectoriels qui composent $\mathbf{g}$. Rappeler la définition de la verticale descendante.

Écrire les composantes de $\mathbf{g}$ et de $\boldsymbol{\Omega}$ dans le repère lié à $\mathcal{R}$.

Dans la suite on prendra $\mathbf{g}$ constante (avec une valeur numérique $g = |\mathbf{g}| = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$).

- 2) Dédire de l'équation (1) les trois équations différentielles satisfaites par les coordonnées x , y et z du point B .
- 3) Quelle est la valeur numérique de Ω ? En vous appuyant sur des valeurs numériques pertinentes, montrer que dans l'équation satisfaite par $z(t)$, on peut négliger le terme proportionnel à Ω devant g .
- 4) Déterminer alors $z(t)$ en tenant compte des conditions initiales.
- 5) En utilisant l'expression trouvée de $\dot{z}(t)$ et en négligeant les termes proportionnels à Ω^2 , déterminer $x(t)$ en tenant compte des conditions initiales.
- 6) Calculer la déviation de la bille dans la direction x après une chute d'une hauteur h . Application numérique pour $\lambda = 45^\circ$, $h = 100 \text{ m}$. Conclure.
- 7) Peut-on déterminer par une telle expérience si on est situé dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud?